

PROVA N. 1

1. Il Midazolam è:
 - a. un analgesico
 - b. un sedativo
 - c. un curaro
 - d. un antiemetico

2. Quale fra le seguenti non fa parte della RSI (rapid sequence intubation)
 - a. analgesia
 - b. miorelaxazione
 - c. controllo della frequenza cardiaca
 - d. Sedazione

3. Cecità parziale o totale è caratteristica dell'intossicazione da:
 - a. tossina botulinica
 - b. metanolo
 - c. oppiacei
 - d. antidepressivi triciclici

4. Le fasi cronologiche del parto sono:
 - a. periodo prodromico, dilatante, espulsivo, secondamento
 - b. periodo espulsivo, secondamento, dilatante
 - c. periodo dilatante, prodromico, espulsivo, secondamento
 - d. periodo prodromico, dilatante, secondamento, espulsivo

5. La valutazione primaria del trauma si differenzia da quella cardiologica nel punto A per:
 - a. la protezione del rachide cervicale
 - b. l'individuazione tempestiva di eventuali emorragie
 - c. la necessità di immobilizzare gli arti potenzialmente fratturati
 - d. la protezione termica

6. Individua quale tra i seguenti parametri non definisce esattamente una condizione di trauma maggiore:
 - a. PA < 90 mmHg
 - b. RTS < 12
 - c. GCS < 14
 - d. frequenza respiratoria < 32

7. Quale tra le seguenti è la complicanza più temibile della manovra di intubazione tracheale?
 - a. lesioni delle corde vocali
 - b. vomito e inalazione
 - c. avulsione di denti
 - d. intubazione dell'esofago non riconosciuta

8. In caso di arresto cardiaco testimoniato quale procedura non è corretta da parte di due soccorritori professionisti?
- a. alternano 30 compressioni a 2 ventilazioni bocca-a-bocca
 - b. effettuano la RCP con solo MCE a 110/min senza ventilazioni
 - c. uno dei soccorritori si allontana in cerca di un DAE e l'altro continua da solo il MCE
 - d. decidono di trasportare la vittima in arresto cardiaco in Pronto Soccorso
9. Il principale beneficio dell'utilizzo dell'adrenalina nell'ACC da FV:
- a. aumentare la pressione di perfusione coronarica
 - b. ripristinare l'attività cardiaca spontanea
 - c. aumentare la contrattilità del miocardio
 - d. aumentare la conduzione atrio-ventricolare
10. La somministrazione di Magnesio è il trattamento indicato per:
- a. TV con torsione di punta
 - b. BAV di III grado
 - c. TV
 - d. FV
11. Quale tra i seguenti ritmi è defibrillabile?
- a. fibrillazione atriale
 - b. Tachicardia ventricolare senza polso
 - c. attività elettrica senza polso
 - d. asistolia
12. La miosi bilaterale, normoreagente alla luce si può avere per:
- a. overdose da oppiacei
 - b. emorragia talamica
 - c. overdose da barbiturici
 - d. tutte le precedenti
13. la pulsossimetria:
- a. Può non essere attendibile in caso di bassa perfusione periferica
 - b. è un indicatore dei livelli ematici di CO₂
 - c. varia in relazione alla saturazione di O₂ dell'Hb
 - d. può dare indicazione alla IOT
14. E' corretto affermare che durante il pacing transcutaneo:
- a. Occorre sempre valutare e confermare la cattura meccanica
 - b. Il pacing è una procedura che spesso non necessita di blanda sedo-analgesia
 - c. Si associa a IOT
 - d. E' indicata nel BAV di Tipo II
15. Nel politraumatizzato in ACC in caso di emorragia:
- a. L'applicazione del Tourniquet è prioritaria rispetto alle manovre RCP
 - b. L'acido tranexamico 1 g ev non aumenta la sopravvivenza del paziente
 - c. L'eco-fast non è indicata
 - d. Non è indicato l'impiego dell'adrenalina

16. Nel trattamento della crisi asmatica grave in un paziente adulto è corretto somministrare:

- a. adrenalina 0,5 mg im in boli ripetibili
- b. corticosteroidi
- c. salbutamolo
- d. tutte le precedenti

17. Nell'intossicazione da beta bloccanti, con scarsa o nessuna risposta all'atropina è utile somministrare:

- a. adenosina
- b. glucagone
- c. insulina
- d. N-acetilcisteina

18. Nel sospetto di shock settico, occorre valutare:

- a. Pressione arteriosa sistolica
- b. Frequenza respiratoria
- c. Stato di coscienza
- d. tutte le precedenti

19. La diagnosi di PNX iperteso in emergenza è possibile valutando:

- a. Enfisema sottocutaneo
- b. Turgore delle giugulari
- c. Ecografia pleurica
- d. Tutte le precedenti

20. Individua la risposta corretta. Le reti per le patologie tempo dipendenti previste dalla Regione Lazio sono:

- a. rete trauma grave e neurotrauma, rete cardiologica e cardiocirurgica, rete perinatale
- b. rete trauma grave e neurotrauma, rete cardiologica e cardiocirurgica, rete ictus, rete perinatale
- c. rete trauma grave e neurotrauma, rete cardiologica e cardiocirurgica, rete ictus
- d. rete trauma grave e neurotrauma, rete ictus, rete perinatale

21. La classica triade semeiologica rappresentata da Cefalea, Rigidità Nucale e febbre indica:

- a. otite acuta
- b. cefalea a grappolo
- c. meningite
- d. stroke

22. In caso di Arresto Cardio Circolatorio, tra le possibili cause, cosa identifica le 4 T:

- a. tromboembolismo, pneumotorace iperteso, intossicazione acuta, tamponamento cardiaco
- b. TV, pneumotorace iperteso, intossicazione acuta, tamponamento cardiaco
- c. tromboembolismo, Toxoplasmosi, intossicazione acuta, tamponamento cardiaco
- d. tromboembolismo cavale, pneumotorace iperteso, intossicazione acuta, tamponamento cardiaco

23. In caso di Arresto Cardio Circolatorio, tra le possibili cause, cosa identifica le 4 I:

- a. ipossia, ipovolemia, ionemia alterata, ipertermia
- b. ipossia, ipervolemia, ionemia alterata, ipotermia
- c. ipossia, ipovolemia, ionemia alterata, ipotermia
- d. intossicazione da farmaci, ipovolemia, ionemia alterata, ipotermia

24. In caso di PNX iperteso il drenaggio toracico:

- a. non è indicato
- b. sempre indicato
- c. si associa a somministrazione di acido tranexanico
- d. nessuna risposta

25. Il target pressorio sistolico in caso di trauma penetrante è:

- a. 70 mmhg
- b. 120 mmhg
- c. 100 mmhg
- d. 60 mmhg

26. Il target pressorio sistolico in caso di trauma chiuso senza trauma cranico è:

- a. 90 mmhg
- b. 120 mmhg
- c. 150 mmhg
- d. 60 mmhg

27. Il target pressorio sistolico in caso di emorragia cerebrale spontanea è:

- a. 70 mmhg
- b. 140 mmhg
- c. 110 mmhg
- d. 60 mmhg

28. La tachicardia ventricolare viene definita sostenuta quando:

- a. ha durata superiore a 30 secondi ed è associata a deterioramento emodinamico
- b. ha durata superiore a 60 secondi
- c. ha durata inferiore a 30 secondi
- d. nessuna delle precedenti

29. Nel BAV di terzo grado:

- a. le attività atriale e ventricolare sono dissociate e tra loro indipendenti
- b. le onde P sono periodicamente bloccate
- c. c'è una conduzione abberrante
- d. la conduzione atrio-ventricolare è lenta

30. La tachicardia ventricolare si caratterizza per un complesso QRS:

- a. irregolare
- b. ridotto
- c. > 0,12 secondi
- d. tutte le risposte sono errate

