

PROVA N. 3

1. La noradrenalina nello shock cardiogeno è indicata quando:
 - a. la PA diastolica è < 90 mmhg
 - b. la PA diastolica è < 70 mmhg
 - c. la PA sistolica è > 90 mmhg
 - d. la PA sistolica è < 70 mmhg

2. I seguenti sono segni di intossicazione da oppiacei tranne uno:
 - a. miosi
 - b. tachicardia
 - c. respiro superficiale
 - d. ipotensione

3. Una delle seguenti affermazioni a proposito del naloxone è errata:
 - a. può essere somministrato per via EV-IM-endotracheale e nasale
 - b. nei neonati può causare sindrome da astinenza
 - c. ha una durata d'azione di 30 minuti
 - d. il dosaggio EV è 0,4 mg fino a 2 mg

4. La succinilcolina è
 - a. un analgesico
 - b. un sedativo
 - c. un curaro (x)
 - d. un antiemetico

5. Cosa si intende con l'acronimo OPACS e per quale valutazione viene attuato?
 - a. obnubilamento del sensorio, pressione arteriosa, aritmie, coma, stabilizzazione frequenza cardiaca – valutazione cardiaca
 - b. ostruzione delle vie aeree, palpazione addome, anosoagnosia, coma, slivellamento arti – valutazione stato di coscienza
 - c. osserva, palpa, ascolta, conta, saturimetro – valutazione ventilazione e respirazione
 - d. otorragia, pneumotorace iperteso, addome acuto, coma, sedazione – valutazione toraco-addominale

6. Nei traumi da esplosione, le lesioni causate dall'onda di pressione sono principalmente a carico di:
 - a. SNC
 - b. orecchio
 - c. arti inferiori
 - d. polmoni

7. Nel caso in cui sia necessario effettuare la RCP su una donna in gravidanza (III trimestre)
- la vittima va mantenuta col fianco destro sollevato di 45-60°, per evitare la compressione aorto-cavale da parte dell'utero
 - la vittima va mantenuta col fianco destro sollevato di 15-30°, per evitare la compressione aorto-cavale da parte dell'utero
 - la vittima va mantenuta col fianco sinistro sollevato di 15-30°, per evitare la compressione aorto-cavale da parte dell'utero
 - la vittima va mantenuta col fianco destro sollevato di 35-45°, per evitare la compressione aorto-cavale da parte dell'utero
8. Il dosaggio pieno del Midazolam nell'adulto è?
- 30 mg
 - 2 mg/kg
 - 0,2 mg/kg
 - 2 mg
9. Quale affermazione sul Flumazenil è errata?
- può innescare una sindrome da astinenza
 - è indicato anche in caso di intossicazione da antidepressivi triciclici
 - ha un'emivita più breve di quella di alcune benzodiazepine
 - è un antidoto specifico per le benzodiazepine
10. E' fortemente consigliato intubare il paziente con un trauma cranico quando il valore del GCS è pari o inferiore a:
- 2
 - 15
 - 3
 - 8
11. Lo Shock ipovolemico è di tipo:
- emorragico
 - non emorragico
 - emorragico e non emorragico
 - nessuna delle precedenti
12. La causa di più frequente di scompenso ventricolare sinistro è.
- cardiomiopatia
 - cardiopatìa ischemica
 - miocardite
 - tossicità da farmaci
13. Un adulto con apertura spontanea degli occhi, risposta verbale confusa e risposta motoria localizzata, ha un GCS di:
- 14
 - 13
 - 11
 - 9

14. L' Acute Respiratory Distress Syndrome:

- a. non comprende patologie quali il polmone da shock e il polmone duro
- b. comprende diverse patologie polmonari a differente etiologia, la cui clinica e terapia sono le medesime
- c. è una patologia esclusiva degli adulti
- d. nessuna delle alternative è corretta

15. Quale tra le seguenti è una causa dell'embolia di origine cardiaca?

- a. lesioni iatrogene
- b. abuso di droghe
- c. protesi valvolare
- d. cisti da echinococco

16. Uno dei seguenti non è un fattore di rischio per TVP e tromboembolia polmonare:

- a. sesso maschile
- b. età > 50 anni
- c. tabagismo
- d. obesità

17. Nell'ACC associato ad annegamento:

- a. L'immobilizzazione della colonna cervicale è sempre prioritaria per i rischi di possibili lesioni spinali
- b. Non può essere eseguita la defibrillazione
- c. Prima della IOT è indicato eseguire compressioni addominali per eliminare l'acqua da stomaco e polmoni
- d. L'amiodarone non può essere eseguito

18. In caso di edema della glottide si impone il trattamento:

- a. salbutamolo
- b. aminofillina
- c. intubazione endotracheale
- d. idrocortisone

19. Il dosaggio del Propofol è

- a. 2 mg pro kg
- b. 5 mg pro kg
- c. 10 mg pro kg
- d. 0,2 mg pro kg

20. La somministrazione di Magnesio è il trattamento indicato per:

- a. TV con torsione di punta
- b. BAV di III grado
- c. TV
- D. FV

21. In caso di shock emorragico la diuresi è:

- a. invariata
- b. ridotta
- c. aumentata e caratterizzata da macroematuria
- d. aumentata

22. la prima causa di morte per dissecazione aortica di tipo A è:

- a. emopericardio e PEA
- b. occlusione degli osti coronarici e IMA
- c. emotorace e PEA
- d. occlusione degli osti coronarici e FV o TVsp

23. Nei pazienti emodinamicamente instabili con indicazione all'intubazione:

- a. il propofol è il sedativo di scelta
- b. la somministrazione di farmaci è controindicata
- c. la ketamina è il sedativo di scelta
- d. l'intubazione non è indicata

24. Nell'intossicazione da Paracetamolo è indicata la somministrazione precoce di:

- a. antitrombina III
- b. N-acetilcisteina
- c. flumazenil
- d. naloxone

25. Isoflurano, desflurano, e sevoflurano sono:

- a. anestetici endovenosi
- b. antidepressivi
- c. anestetici inalatori
- d. inibitori della pompa protonica

26. Quando non è indicata la RSI (rapid sequence intubation)?

- a. nell'arresto cardiaco
- b. in caso di GCS =7
- c. nel paziente che presenta riflessi del tronco encefalico
- e. nell'insufficienza respiratoria grave con indicazione all'intubazione

27. le indicazioni all'utilizzo dell'Amiodarone sono:

- a. TV con torsione delle punte
- b. FV/TVsp persistente e ricorrente
- c. bradicardie sintomatiche
- d. TIA

28. In caso di ostruzione delle vie aeree grave o completa, con vittima cosciente, occorre preliminarmente:

- a. effettuare le compressioni toraciche
- b. assestare fino a 5 colpi sulla schiena, tra le scapole con il palmo della mano
- c. eseguire la manovra di Sellick
- d. somministrare fino a 10 compressioni addominali

29. Quale tra i seguenti ritmi è defibrillabile?

- a. fibrillazione atriale
- b. asistolia
- c. attività elettrica senza polso
- d. tachicardia ventricolare senza polso

30. Quale tra i seguenti ritmi è defibrillabile?

- a. fibrillazione atriale
- b. attività elettrica senza polso
- c. fibrillazione ventricolare
- d. asistolia